

Pacientes com sinais ou sintomas de COVID-19 ou Influenza
Febre E/ou risco de piora do quadro respiratório?
NÃO
SIM
Testar, SE TR-Ag disponível E isolamento domiciliar
PROCURAR ATENDIMENTO DE SAÚDE
RECOMENDA-SE A TESTAGEM POR TR-AG
TESTE REAGENTE OU DETECTÁVEL?
SIM (OU TESTE INDISPONÍVEL)
STATUS VACINAL ATUALIZADO?
SIM (OU TESTE INDISPONÍVEL)
TESTE REAGENTE OU DETECTÁVEL?
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
• ISOLAMENTO DOMICILIAR DE ATÉ 24H APÓS REMISSÃO DOS SINTOMAS OU A CRITÉRIO MÉDICO
• COLETAR RT-PCR, SE GESTANTE OU SE EVOLUIR PARA INTERNAÇÃO.
• ISOLAMENTO DOMICILIAR POR 10 DIAS E 24H SEM FEBRE E MELHORA DOS SINTOMAS
• ORIENTAR A PROCURAR ATENDIMENTO SE SINAIS DE ALARME
• ISOLAMENTO DOMICILIAR POR 7 DIAS E 24H SEM FEBRE E MELHORA DOS SINTOMAS
• ORIENTAR A PROCURAR ATENDIMENTO SE SINAIS DE ALARME
• ISOLAMENTO DOMICILIAR POR 7 DIAS E 24H SEM FEBRE E MELHORA DOS SINTOMAS
• SE POSSÍVEL, COLETAR RT-PCR E AVALIAR O USO DE OSELTAMIVIR
QUARENTENA DE CONTATOS
CONTATOS PRÓXIMOS ASSINTOMÁTICOS: RECOMENDA-SE A QUARENTENA DE 10 DIAS, PODENDO SER REDUZIDA PARA 7 DIAS SE TESTE DISPONÍVEL E NÃO REAGENTE, (REALIZADO NO 5º DIA APÓS O ÚLTIMO CONTATO).
OS CONTACTANTES, SE INICIAREM QUALQUER SINTOMA, SEGUEM AS RECOMENDAÇÕES PARA CASOS SUSPEITOS. CONTACTANTES PRÓXIMOS DOMICILIARES NÃO TEM RECOMENDAÇÃO DE TESTAGEM SE INICIAREM SINTOMAS, PODENDO SER CONFIRMADOS POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO.

CEVS